

## RESPUESTAS CORRECTAS CAMPAÑA DE ENCUESTAS

-¿Qué porcentaje de infecciones bacterianas contienen biofilm?: **75%**

-Las bacterias que forman un biofilm son hasta **1000** veces más resistentes a los antibióticos que las infecciones libres de biofilm

-¿Qué porcentaje de pacientes diabéticos desarrollarán una úlcera de pie diabético? **Entre un 10 y un 15%**

-¿Qué % de úlceras de pie diabético acaban en amputación del pie o la extremidad? **>15%**

-¿Qué problemas puede suponer para el profesional sanitario el exceso de exudado?

**Maceración y erosión de la piel perilesional**

**Incremento de curas**

**Estancamiento de la lesión**

-¿Qué problemas puede suponer para el paciente el exceso de exudado?

**Fugas, manchas, mal olor**

**Efectos psicosociales**

**Caída del apósito**

-El exudado:

**Previene la desecación del lecho**

**Ayuda la migración de células reparadoras**

**Provee nutrientes esenciales**

-Las ISQ (infecciones de sitio quirúrgico) son una complicación frecuente de las intervenciones quirúrgicas. ¿En qué % ocurren? **5%**

-La mayor parte de las especies bacterianas que causan las ISQ (infecciones de sitio quirúrgico)

**Forman parte de la microflora habitual del paciente**

-Cuando las bacterias se encuentran formando parte de un biofilm ¿tienen mayor o menor tolerancia a los antibióticos y antisépticos tópicos?

**Mayor**

- ¿Conoces los mecanismos de acción de la TPN?

Retracción de la herida

Estimulación de la granulación

Retirada de exudado

-La TPN reduce el edema intersticial. Y con ello se consigue:

Un aumento de la microcirculación

Estimulación del flujo sanguíneo

Estimulación de la oxigenación

-¿Qué número de personas parecen al año en Europa infecciones asociadas a la atención sanitaria?

4 millones de personas

A la hora de afrontar los costes de una ISQ (infección de sitio quirúrgico) debemos tener en cuenta:

Costes directos

Impacto en la salud del paciente

Morbi-mortalidad asociada

¿Qué gastos comportan los costes directos de una ISQ (infección de sitio quirúrgico)?

Hospitalización prolongada

Tests diagnósticos y tratamiento

Reintervenciones

-El centro europeo de prevención y control de enfermedades define la ISQ como la infección que ocurre en los 30 días posteriores a un procedimiento quirúrgico

-La ISQ es la infección más común dentro de las infecciones nosocomiales. El 60,1% de las mismas aparecen **Tras el alta**

-Abandonar el hábito tabáquico previo a la cirugía se asocia con una reducción del 50% en el riesgo de infecciones postoperatorias

-¿Con qué frecuencia las heridas de difícil cicatrización presentan biofilm?

72,8%

-¿Qué debemos considerar al elegir un apósito antimicrobiano?

Sus propiedades antibiofilm

Manejo de exudado

Evaluación exhaustiva del paciente

-El desbridamiento periódico permite cicatrizar \_\_El doble\_\_ de heridas de difícil cicatrización

-Las metaloproteinasas (MMPs) son:Enzimas

-¿Cómo están dispuestas las células en el tejido cicatricial? En una dirección, paralelas